

▫ Téma : **Žriebäci kach / žriebäcie /**

- pôvodca **baktéria** / streptococcuss / = **hlien + hnis chorých koní**
- horúčka, hnisavý zápal nosovej sliznice, hltana a hrtana
- hnisanie sánkových miazgových uzlín
- ID = **4 – 12 dni, 40 – 41 °C** , nechutenstvo, telesná únava
- hnisavý výtok z nozdier, sánkové miazgové uzliny silno opuchnú , vyplnia celý medzi sánkový priestor , v ktorom sa vytvorí tvrdá , teplá a bolestivá opuchlina
- opuchlina neskôr zmäkne a prevalí sa z nej žltý hustý hnis, kašeľ, ťažké dýchanie
- po vytečení hnisu teplota klesne , vracia sa chuť do žraniu a o **10 - 14 dní** kôň sa uzdraví
- ťažké prípady = zhnisajú aj krčné , priušné , pľúcne a črevné miazgové uzliny, ťažký a dlhý prebeh – riziko úhynu
- komplikácie = zápal pľúc , obličiek , pečene , sleziny a mozgu , ktoré spôsobujú uhynutie

LIEČENIE

- izolácia chorých koní = čistá a vzdušná maštaľ
- ľahko stráviteľné a diétne krmivo , ako nápoje z múky a otrúb , zelené krmivo , mrkvu , repu a pod.
- teplé obklady , sivá ortuťová masť = dozretie opuchliny, postup podľa veterinára

OCHRANNÉ OPATRENIA

- choré kone oddelíme od zdravých a stajňu dôkladne vydezinfikujeme
- správne kŕmiť kone a účelným otužovaním zosilníme odolnosť koňa voči tejto chorobe .
- novokúpené pre istotu na **14 dní** dáme do karantény

<http://www.acare.sk/veterina/vlastnosti-vetericynu>

<http://uzasnekone.blog.cz/0912/2>

