

## Téma : **MERANIE A VÁŽENIE ŽRIEBAT**

- nesúl'adost' – rozhádzanosť tela žriebät sa prejavuje v jednotlivých častiach tela a iným vzájomným pomerom veľkosti časti tela v porovnaní s dospelým koňom
- najmä vzájomný pomer **VÝŠKA V KOHÚTIKU : DĹŽKA TELA, VÝŠKA V ZADKU, OBVOD HRUDNÍKA a pomer PALICOVEJ a PÁSKOVEJ VÝŠKY V KOHÚTIKU**

### **a/ Vzájomný pomer PALIC. VÝŠKY V KOHÚTIKU K DĹŽKE TELA / RÁMEC ŽRIEBAŤA /**

- rámec uliahnutého je síce obdĺžnikový, ale ten leží na kratšej strane / niekedy však býva aj štvorcový, ak je výška tela väčšia ako dĺžka tela, vo veku od jedného roka do jeden a pol roka sa výška tela s jeho dĺžkou vyrovnáva a od tohto veku nadobúda dĺžka prevahu nad výškou. Z pôvodne obdĺžnikovitého postaveného na kratšej strane sa teda najprv vytvorí štvorcový a od veku 18 mesiacov obdĺžnikovitý rámec **PRIČOM OBDĹŽNIK LEŽÍ NA DLHŠEJ STRANE !**
- zo zmenou rámca tela sa mení aj vzájomný pomer medzi palicovou výškou v kohútiku / VK / a dĺžkou tela / DT /
- **po uliahnutí VK väčšia ako DT. Po jednom roku VK = DT a neskôr začína prevládať VK na DT a tento pomer ostáva aj v dospelosti**

### **b/ Vzájomný pomer PALIC. VÝŠKY V KOHÚTIKU K VÝŠKE ZADKU/PRESTAVANOSŤ /**

- po uliahnutí VK je vyššia ako v krížoch / výška v zadku /, ale po spevnení šliach, najmä sponky býva v krížoch väčšia ako v kohútiku – **HOVORÍME, ŽE JE PRESTAVANÉ**, ktorá sa postupne vyrovnáva – stráca sa vo veku 1 roka
- od veku 1 roka začína prevažovať VK na VZ / krížoch /, po ukončení rastu teplokrvníky a chladnokrvníky VK o 1 – 2 cm vyššia ako VZ. No niekedy vyrovnané, aj prípady, že kôň je „prestavaný“ aj v budúcnosti

### **c/ Vzájomný pomer PÁSKOVEJ VÝŠKY V KOHÚTIKU K OBVODU HRUDNÍKA**

- po uliahnutí výška v kohútiku / pásková aj palicová / **je väčšia ako OH**
- pri teplokrvných sa OH vyrovnáva s páskovou **VK vo veku 6 – 7 mesiacov**. 7 mesiaci má byť obvod hrudníka väčší ako pásková VK, pri chladnokrvných **už 4 mesiaci** / znak väčšej ranosti /
- vo veku 1 roka rozdiel u teplokrvných **asi 10 cm** a chladnokrvných **asi 18 cm** v prospech OH, v priebehu ďalšieho roka sa zväčšuje **a je 18 – 28 cm**. Ak je rozdiel medzi páskovou VK a OH menší = **žriebä vysokonohé** / má málo hĺbky / alebo pod neho fúka / znak väčšieho vzrastu do výšky / a pri väčšom rozdieli = **žriebä je hlboké** / znak menšieho výškového vzrastu /
- ak pri uliahnutí bývajú hrubšie, rozhádzanejšie, disharmonické a majú lepšie vyjadrené kĺby = **vyrastie veľký a mohutný kôň**
- ak menšie, súladnejšie a menej vyjadrené kĺby = **nedosahujú v dospelosti žiaduci rámec a mohutnosť**
- pri uliahnutí rozdiel medzi pohlaviami v zovňajšku minimálny, neskôr žrebčeky mohutnejšie a menej súladné ako kobyľky, po dvoch rokoch pohlavný dimorfizmus zreteľnejší a vo veku **5 rokov** by malo byť jasné či ide o žrebca alebo kobyľu

### **Vzájomný pomer PÁLICOVEJ VÝŠKY K PÁSKOVEJ VÝŠKE V KOHÚTIKU**

- palicová výška je menšia ako pásková / plece koňa je klenuté / = zachytáva kľenutie pleca
- po uliahnutí je celkom ploché = rozdiel malý **4 – 6 cm** a postupne sa zvyšuje / napr. 4 rokoch **10 cm = rozpätie 7 – 13 cm**, pri chladnokrvných koňoch väčší ako u teplokrvných /