

Téma : **ROZDELENIE PLEMIEN OVIEC**

Ovce patria medzi najstaršie domáce zvieratá. Sú zdomácnené **osemtisíc až desaťtisíc** rokov. Predchodcom dnešných kultúrnych plemien oviec sú divé formy, ktoré rozdeľujeme do týchto skupín :

- 1. skupina skalných oviec (muflóny),**
- 2. skupina stepných oviec (archar),**
- 3. skupina vysokohorských oviec (argali).**

Od muflóna sa odvodzujú severské krátkochvosté ovce, napr. **romanovská a východofrízka**. Muflóny sú ešte i dnes rozšírené vo voľnej prírode v južnej Európe a v západnej Indii.

Od archara sa odvodzujú všetky ovce merinového typu, dlhochvosté a tenkochvosté, medzi ktoré sa zaraďujú **cigájky, valašky a anglické výkrmové plemená**. Okrem toho do tejto skupiny zaraďujeme tučnouchvosté ovce (**karakulská ovca**)

Od argala sa odvodzujú stredoázijské ovce, ktoré sa nazývajú aj vysokohorské. Žijú v masívoch Pamíru, Ťan – Šanu a v Himalájach.

Rozdelenie plemien

Pri rozdelení plemien oviec sa berú do úvahy hľadiská, ako akosť vlny, jemnosť vlny, počet ročných striží, chovný smer, utváranie chvosta, chovné oblasti.

Podľa akosti vlny rozoznávame plemená :

- **s pravou vlnou** (**merinka, cigájka, texel, cheviot**),
- **so zmiešanou vlnou** (**valaška, šumavka, karakulská**),

Podľa jemnosti vlny delíme plemená oviec na :

- **jemnovlnové** (**všetky merinové ovce – slovenské, austrálske, askánske, kaukazské a i.**),
- **polojemnovlnové** (**cigájka, texelská, východofrízka ovca, lincoln, leicester a i.**),
- **polohrubovlnové** (**zošľachtená valaška**),
- **hrubovlnové** (**karakulská ovca, pôvodná valaška**).

Podľa počtu ročných striží rozlišujeme plemená na :

- **jednostrižné**, ktoré sa strihajú raz do roka, väčšinou na jar (jemnovlnové a polojemnovlnové plemená),
- **dvojstrižné**, ktoré sa strihajú na jar a na jeseň (polohrubovlnové a hrubovlnové plemená).

Podľa chovného smeru plemená oviec delíme na :

- **vlnové** (**stavropoľské merino**),
- **vlnovo – mäsové** (**slovenské merino, askánske a kaukazské merino**),
- **mäsovo – vlnové** (**kent, lincoln, leicester, texel a i.**),
- **dojné ovce s pravou vlnou** (**cigájka, východofrízka ovca**),
- **dojné ovce so zmiešanou vlnou** (**valašky**),
- **kožušinové** (**karakul**),
- **Kožuchové** (severské krátkochvosté ovce, z ktorých je najznámejšia je **romanovská ovca**).

Podľa utvárania chvosta rozdeľujeme plemená na :

- **krátkochvosté** (majú **najviac 13 chvostových stavcov**, patrí sem **romanovská ovca, vresová ovca**),
- **tučnozadké** (na konci panvy je vyvinutý **tukový vak**, chvost je málo viditeľný – **gissarské ovce**),
- **dlhochvosté** (majú **13 a viac chvostových stavcov** – **merinka, cigájka, valaška**).

Podľa chovných oblastí plemená delíme na :

- **nížinné** (oblasti **jemnovlnových plemien**)
- **podhorské** (oblasti **polojemnovlnových plemien**)
- **horské** (oblasti **polohrubovlnových a hrubovlnových plemien**)