

Téma : **ODSTAV ŽRIEBAT**

- vek do jedného roku = najdôležitejší pre rast a vývin žriebät
- odstav žriebät = najkritickejšie štádium
- čím neskôr, tým je to priaznivejšie pre jeho ďalší rast a vývin
- **NEMAJÚ SA ODSTAVOVAŤ PRED 4 MESIACOM VEKU**
- **ODSTAV = 4 – 5 MESIACOV VEKU, PLNOKRVNÍKY = 5 – MESIAC VEKU**

Postupnosť odstavu

- navykať na kratšiu, dlhšiu neprítomnosť matky / nepriaznivé počasie = kobyľa pracuje a žriebä je v maštali, zvykne si aj na uviazanie
- obmedzovanie prístupu k cicaniu 3*, 2*, 1* denne = kobyľa sa postupne zasušuje / oddávanie aj po odstave = prevencia pred mastitídou /
- ak už vemenó zatvrdlo = vydojenie aj násilím + dostatok pohybu / klus / = po 1 – 2 hodinách sa zatvrdnutie stratí
- zníženie produkcie mlieka = úprava kŕmnej dávky a zníženie množstva kŕmív 2 – 3 dni pred odstavom / koncentrované kŕmivá, výlisky, otruby, granule, ovos + menej napájame /
- medzi 4 – 5 mesiacom = navyknuté na ohlávku, nasadíme na hlavu

Technika odstavu

- žriebä s matkou do maštale, kde mienime ustajniť žriebä
- rýchle vyvedenie matky
- niektoré kobyly / napr. prvnôstky / = odstavom rozrušené / behanie po maštali, hľadanie žriebäťa, erdžanie / : maštal' s odstavenými žriebätmi tak aby nebolo počuť erdžanie
- odstavené žriebätá = behajú po maštali, erdžia – smútia za svojou matkou, 1 – 2 dni nežerú
- zostávajú na maštali, nepúšťajú do výbehov, na pasienky
- po upokojení = pri pohybe vo výbehoch, pasienkoch zabrániť kontaktu s matkou = snaha úniku k matke / erdžanie /
- až po týždni, niekedy aj dlhšie = zabúdanie na matku
- po odstave samostaný box = odchováva až do zaradenia do základného výcviku
- druhá možnosť = v boxe dve žriebätá skôr zabudnú na matky
- maštal, výbeh, pasienok = obidve pohlavia do veku 1 roka, potom oddeliť

Kŕmenie odstavených a starších žriebät

- strata hlavného zdroja živín = materského mlieka
- ľahko stráviteľné kŕmivá + minerálne látky + stopové prvky
- obžieranie stien, žranie hliny = deficit minerálnych a stopových prvkov
- malý žalúdok = hodnotné kŕmivá s bohatým obsahom živín
- častejšie kŕmenie = najmenej 4 * denne
- u plnokrvníkov nešetriť koncentrovanými kŕmivami = ovplyvnenie neskoršej výkonnosti
- umenie pri plnokrvníkoch = prinútiť k žraniu čo najväčšieho množstva koncentrovaného kŕmiva / schutňovanie napr. melasou /
- zbytky kŕmív sa pred ďalším kŕmením vyberie z válova = dospelým koňom

Poznámka :

Zhruba od 3. týždňa = prikrmovanie miagánym ovsom a lučným senom.

Koncom 2. mesiaca - je to 1kg sena + 1 kg ovsa

Koncom 3 . mesiaca - 2 kg sena + 1 kg ovsa

Medzi 4. - 5. mesiacom - 3 kg sena + 2 kg ovsa

Ovos nikdy nemiagame do zásoby! Mladým žriebätám podávame buď celé vajíčko alebo vaječný bielok. Okolo 6. mesiaca = odstav. V tuto dobu začneme s prikrmovaním okopaninami - kŕmnou repou, kŕmnou mrkvou, cukrovou repou = strúhané .Kŕmime najmenej 4x denne.

Do 1 roku musí dostávať kvalitní kŕmivo (ovos, seno, pšeničné otruby, bôb, lanové semeno, pokrutiny, kŕmnou mrkvu, kŕmnou repu). Najhodnejším je pasienkový porast, bohatý na zdroj bielkovín, minerálnych látok a vitamínov. Pohyb na čerstvom vzduchu a slnečné žiarenie má

blahodarný vplyv na látkový metabolizmus, vývin kostry / D/ a svalstva, činnosť srdca a pľúc. V 2. - 3. mesiaci (v prvé pastevné obdobie) začínajú pasienkový porast aktívne spásat'. V druhom pastevnom období prikrmujeme senom a ovsom. Koniec obdobia spadá zhruba do veku 18. mesiacov .

Krmí sa:

- 5 - 10 kg sena
- 2 - 4 kg jadrového krmiva
- 3 - 5 kg okopanín

Dvojiročným znižujeme jadrové krmivo až na 2 kg, seno se nemení.

KRMENÍ HŘÍBAT <http://kone.czechian.net/krmeni.htm>

První výživou hříbete je zhruba asi 5 dní mlezivo, které se potom upravuje na běžné mateřské mléko. V prvním měsíci saje hříbě každou hodinu, poté se interval prodlužuje na 2 - 2,5 hod. Proto pokud je klisna v práci, provádíme přestávky, aby se hříbě mohlo napít.

Zhruba asi 4. den vypouštíme hříbě s klisnou do výběhu.

Pokud klisna produkuje málo mléka, přikrmujeme kravským nebo kozím mlékem. V případě, že hříbě osiřelo, je nutné mu zajistit náhradní zdroj potravy. Nejúčinnější a nejlepší je umístit hříbě u náhradní klisny. Neseženeme-li klisnu, můžeme zkusit sehnat kozu. Ta může hříbě odchovat, neboť její mléko má stejné složení jako kobyly. A nemáme-li k dispozici ani kozu, krmíme hříbě ředěným kravským mlékem v poměru 1 : 2. Zde je nutno dodržovat hygienické požadavky, čistotu a teplotu. Hříbě krmíme každé 2 hod. čerstvým mlékem.

Zhruba od 3. týdne začneme hříbě přikrmovat mačkaným ovsem a lučním senem.

Koncem 2. měsíce - je to 1kg sena + 1 kg ovsa

Koncem 3. měsíce - 2 kg sena + 1 kg ovsa

Mezi 4. - 5. měsícem - 3 kg sena + 2 kg ovsa

Seno i mačkaný oves zkrumujeme nejlepší jakosti. Oves nikdy nemačkáme do zásoby! Mladým hříbatům podáváme buď celé vajíčko nebo vaječný bílek.

Okolo 6. měsíce provádíme odstav. V tuto dobu začneme s přikrmováním okopanin - krmnou řepou, krmnou mrkví, cukrovkou - vše podáváme strouhané. Jestliže hříbě začne žrát zed' nebo hlínu, znamená to, že v jeho krmné dávce je nedostatek minerálií a stopových prvků, kterými musíme krmivo doplnit. Hříbata krmíme nejméně 4x denně.

Hříbě do 1 roku musí dostávat vysoce kvalitní krmivo (oves, seno, pšeničné otruby, bob, lněné semínko, pokrutiny, krmnou mrkev, krmnou řepu). Nejvhodnější je pastevní porost, neboť je bohatý na zdroj bílkovin, minerálních látek a vitamínů. Taky pohyb na čerstvém vzduchu a sluneční záření má blahodarný vliv na látkový metabolizmus, vývin kostry a svalstva, činnosť srdce a plic.

Asi ve 2. - 3. měsíci (v prvním pastevním období) začínají hříbata pastevní porost spásat.

V druhém pastevním období přikrmujeme senem a ovsom. Konec druhého pastevního období spadá zhruba do stáří 18. měsíců, kdy jsou hřebečci i klisničky již dobře vyvinuti.

Krmí se:

- 5 - 10 kg sena
- 2 - 4 kg jádra

- 3 - 5 kg okopanin

Dvouletým hříbatům snižujeme jádro až na 2 kg, seno se nemění.

A opět pár zásad při krmení:

1. Neoptimálnější je tedy pastevní odchov hříbat
2. Jadrná krmiva zkrmujeme individuálně
3. Do 18. měsíců podáváme jádro mačkané, drcené a nepodáváme slámu
4. Při stájovém krmení nedáváme objemná krmiva do žebříků, aby hříbata neprohýbala hřbet