

Téma : **VÝŽIVA A KRMENIE CHOVNÝCH KOBÝL**

- vývoj nového jedinca je v druhej polovici žrebnosti veľmi intenzívny
- nezaťažovať nadmernou prácou, mesiac pred žrebením a dva týždne po = vhodné len prechádzky, veľmi prospievajú

1 mes.	2 mes.	3 mes.	4 mes.	5 mes.	6 mes.	7 mes.	8 mes.	9 mes.	10 mes.	11 mes.
2 g	20 g	100 g	1,6 kg	4 kg	5 kg	6 kg	12 kg	19 kg	35 kg	50 kg

- značný tlak maternice na tráviace orgány = riziko porúch v ich činnosti + nekvalitné krmivo, mladé seno
- KD = dostatok dusíkatých látok, kost'otvorných minerálnych látok, provitamín karotén, B,D,E, C = aj prídavkom dobrej siláže 5 – 10 kg, prípadne okopaninami, krmna mrkva
- minerálna výživa = **10 – 50 g** krmnej soli, Ca a P = krmne vápno, plavená krieda, mletý vápenec **30 – 50 g**, deficit kost'otvorných činiteľov = osteomalácia
- problém potratov = aj pri dobrej výžive potratí v priemere každá **25 kobyľa**, pri zlej **každá tretia**
- kŕmiť minimálne trikrát za deň, prevencia pre zápchami = nápoj z ľanového semena – mierne laxatívny účinok
- časté čistenie a mierny pohyb = podpora látkového metabolizmu
- individuálny box, starostlivosť = podstielka, výkaly,
- pred ožrebením = znižovanie dávky objemových krmív, dobré lúčne seno – vyrad'uje sa lucernové a d'atelinové seno, dobrý d'atelinotrávny porast
- ideálne jadrové krmivá vo forme mierne teplého nápoja / nápoj zo pšeničných otrúb a ľanového semena alebo výliskov / , pôsobí dieteticky a na tvorbu mlieka – to isté aj po ožrebení
- **3 až 6 dni** po ožrebení kŕmiť opatrne , postupne prejsť na obvyklý spôsob kŕmenia + prídavok kŕmnych okopanín **8 – 10 kg** = tvorba mlieka, krmna mrkva, kvalitná siláž / **50 %** z kŕmnych okopanín / , slnečnicové výlisky **1 – 1,5 kg**
- výživa a kŕmenie vplyv na včasné oplodnenie po ožrebení : podľa možnosti hneď v prvej ruji po ožrebení = **8 – 10 deň** po ožrebení / **od 5 – 15 dňa** / , vysokokvalitné seno, naklíčený ovos / E / , pšeničné otruby, kŕmnu mrkvu, malé dávky kvalitnej siláže
- **A = kŕmna mrkva, D = sušené cukrovárske kvasnice, E = naklíčený ovos**
- žrebné a dojčiacie kobyly citlivo reagujú na náhle zmeny v kŕmení, nekvalitné krmivo = poruchy trávenia + znížená laktačná aktivita, zmeny v zložení mlieka + hnačky žriebät
- poruchy trávenia dojčiacej kobyly = nápoj, nálev z karlovarskej soli a po niekoľkých hodinách rumančekový odvar so živočíšnym uhlím
- dôležité napájanie žrebných a dojčiacich kobýl = vplyv na tvorbu mlieka / prvé dva – tri mesiace **10 - 12 litrov**, niekedy aj viac
- žrebenie väčšinou na jar = problém s kvalitnou pašou, **30 – 40 kg** + dvakrát denne **1,5 – 3 kg ovsa**