

Téma : **VYHODNOTENIE NAVRHNUTEJ KD PRE KOBYLU KLASICKÝM SPOSOBOM**

<b>Pridavok živín</b>	<b>SNL</b>	<b>ŠJ</b>	<b>Ca</b>	<b>P</b>	<b>Na</b>	<b>Beta karotén / mg /</b>
8 – 9 mesiac žrebnosti	165	0,7	20	10	10	80
10 – 11 mesiac žrebnosti	330	1,35	20	10	10	80
1 – 2 mesiac po ožrebení	480	2	20	10	10	100
3 – 4 mesiac po ožrebení	340	1	20	10	10	100

**Kobyľa 600 kg živá hmotnosť + 8 mesiac žrebnosti**

<b>KN - KD</b>	<b>S</b>	<b>SNL</b>	<b>ŠJ</b>	<b>Ca</b>	<b>P</b>	<b>Na</b>
<b>600 kg ž.h</b>	12,4	800	5,1	51	41	12
<b>8 mes. žrebnosti</b>		165	0,7	20	10	10
<b>600 kg/ 8 mesiac</b>	12,4	965	5,8	71	51	22
<b>Pasienkový porast</b>	25 %	2 %	11/100 kg	1,6	1,1	0,5
<b>1 kg pasienkového porastu</b>	0,25	20	0,11	1,6	1,1	0,5
<b>40 kg pasienkového porastu</b>	10	800	4,4	64	44	20
<b>DKZ pre žrebné kobyly</b>	85 %	7 %	60/100 kg	2	1,6	1
<b>1 kg DKZ</b>	0,85	70	0,6	2	1,6	0,8
<b>3 kg DKZ</b>	2,55	210	1,8	6	4,8	2,4
<b>40 kg PP / 3 kg DKZ</b>	12,55	1010	6,2	72	48,8	22,4
<b>ROZDIEL</b>	+ 0,15	+ 45	+ 0,4	+ 1	- 2,2	+ 0,4
<b>TOLERANCIA + - 10 % KN</b>	+ - 1,24	+ - 96,5	+ - 0,58	+ - 7,1	+ - 5,1	+ - 2,2