

Téma : **VÍRUSOVÝ POTRAT KOBÝL**

- Je to veľmi nákazlivá choroba a spôsobuje občas veľké straty najmä v žrebčincoch .
- Nákaza sa rozširuje jednak priamym stykom chorých kobýl priamo so zdravými žrebnými kobyľami , jednak nakazeným krmivom , vodou , stelivom a rozličnými maštal'nými predmetmi .

Príznaky :

- Asi o **18 - 60 dní** po nakazení sa dostaví u kobýl náhle , bez predchádzajúcich chorobných príznakov = **potrat** .
- Potrat u nakazených kobýl prebieha rýchlo za silného potenia a miernych bolestí , obyčajne bez následkov .
- Nakazené kobyly potratia najčastejšie **v 7 až 11 mesiaci** . **Zriedka v 3 a 6 mesiaci** .

Liečenie:

- Liečebné prostriedky ešte nemáme.

Ochráné opatrenia :

- Vysokožrebné kobyly sa majú podľa možností deliť od ostatných kobýl .
- Treba dodržiavať hygienu , ošetrovatelia si často umývať ruky a šaty a obuv , pri práci zo žrebnou kobyľou .
- Treba venovať zvýšenú starostlivosť (kŕmenie , ošetrovanie a správne používanie žrebných kobýl)
- Každý prípad potratu treba pozorne vyšetriť , zistiť príčinu , prípadne zaslať potratený plod veterinárovi .
- Potrebné opatrenia má robiť veterinár .

<https://vsetko-o-konikoch.estranky.cz/clanky/choroby-koni-a-ich-liecenie/>

<http://crzp.uniag.sk/Prace/2010/Z/C68E6AB731D64AF68900CFB8DFDA5171.pdf>



(www.ansteadvet.com.au)