

Téma : **HEMORAGICKÁ CHOROBA KRÁLIKOV – M O R K R Á L I K O V**

- Mor králikov je **vírusová hemoragická** / **hemoragia** = krvácanie / **septikémia** / **otrava krvi** / , je relatívne nové ochorenie,
- Prvý krát opísané v r. **1984 v Číne**.
- Počas nasledujúcich troch rokov sa rozšírilo do Európy (**u nás sa mor vyskytol prvýkrát v r. 1987**) a dnes sa vyskytuje na štyroch kontinentoch.
- Ak dôjde k vypuknutiu moru v chovoch králikov, dochádza k veľmi vysokým stratám spôsobených úhynom zvierat. Mortalita môže dosiahnuť **až 100%**.

Pôvodca:

- **VÍRUS**

Klinické príznaky:

- Mor králikov prebieha **najčastejšie v perakútnej alebo akútnej forme**.
- **Chronická a subchronická** forma sú výnimočné.
- Klinické príznaky sú najprv nenápadné: malátnosť, **somnolencia** = chorobná ospalosť, **inapetencia** = nechutenstvo, nechúť do príjmu krmiva.
- V priebehu niekoľkých hodín sa môžu objaviť nervové príznaky – **parézy** = čiastočná strata hybnosti, neuplná obrna, **paralýzy** = strata schopnosti pohybu, kŕče, **epistaxis** = krvácanie z nosa, **edém** = opuch spojiviek, prípadne **cyanóza** = modrasté až tmavomodré sfarbenie kože a slizníc
- Priebeh je väčšinou veľmi rýchly – **zvíra uhynie počas 12-24 hodín** po objavení prvých klinických príznakov.
- Často nachádzame už mŕtve králiky bez akýchkoľvek príznakov, väčšinou v dobrej kondícii.
- Pri pitve zistujeme **krvácaniny na pohrudnici, pobrušnici a obličkách**.
- Na ochorenie sú **najodolnejšie** mláďatá **do veku 60 dní**.

Prenos:

- Priamym kontaktom, vzduchom, prachom, bodavým hmyzom, krmivom, chovateľskými pomôckami.
- K rýchlemu šíreniu prispieva aj nedostatočná výživa a nevhodná zoohygiena v chove.

Terapia, prevencia:

- Terapia moru králikov neexistuje, **jedinou účinnou ochranou je včasná a pravidelná vakcinácia králikov**.
- Veľký význam pre vytvorenie zdravého a odolného chovu má správne dodržiavanie vakcinačnej schémy.
- Vakcinačná schéma súvisí s vekovou rezistenciou králikov voči vírusu.
- Je známe, že **pred dosiahnutím 4. týždňa sú králiky voči vírusu prakticky nevnímavé**.
- Medzi **4.-10. týždňom sa vnímavosť zvyšuje** a u zvierat vo veku **nad 10 týždňov dosahuje maximum**.



Internetové zdroje :

<https://zverolekarka.com/mor-kraliku/>

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=hGzHX-veArHMgwfH45vwCA&q=Mor+kr%C3%A1likov&og=Mor+kr%C3%A1likov&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAYBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgQIABBHOgQIABBDOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwE6AgguOgsILhCxAXCDARCTAjoICAAQFhAKEB5Qke0gWLKNIWDipiFoAHACeACAAyMBiAHvCZIBAZUuN5gBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&scient=psy-ab&ved=0ahUKEwjrsMe8i6_tAhUx5uAKHcfxBo4Q4dUDCAw&uact=5