

## Téma : **DOMÁCE PLEMENÁ V CHOVE OVIEC**

### **Jemnovlnové plemená**

**Slovenská merinka** patrí k mäsovovlnovému úžitkovému typu stredne dlhého telesného rámca, s dobrým ovlnením nôh, hlavy a brucha. Živá hmotnosť oviec býva **50– 60 kg**, baranov **80 – 85kg**. Ročná striž bahníc je **4,5 – 7 kg**, baranov **8 – 12 kg**, prirodzená dĺžka vlny je **6 – 9cm**, plodnosť **130 %**. Sortiment vlny je **AA - A/B**, výťažnosť vlny **45 – 48 %**



### **Polojemnovlnové plemená**

**Cigájka** je polojemnovlnové plemeno s trojstrannou úžitkovosťou – vlny, mäso, mlieko. Chová sa na strednom Slovensku. Patrí medzi najstaršie kultúrne plemená oviec. Hlavu a konce končatín má sfarbené do tmavohnedá až čierna. Rúno je polouzavreté, biele, s kvalitnou polojemnou lesklou vlnou. Jahňatá sa liahnu sivočierne. Po **4 – 6 mesiacoch** sa pigmentácia stráca, koža zostáva tmavoružová. Vyznačuje sa stredným telesným rámcom, mierne oblúkonosnou hlavou a jemnejšou kostrou. Je to plemeno odolné, prispôsobené drsnejším chovateľským podmienkam. Živá hmotnosť baranov je **70kg**, bahníc **45 – 50kg**, ročná striž potnej vlny bahníc je **3kg**, baranov **5kg**. Sortiment vlny **C –C/D**, výťažnosť **65 %**, plodnosť **115 – 125 %**. Produkcia mlieka je **160kg** ( po odstave jahňaťa **90 kg** ). Mäso je chutné, nepretučnené, šťavnaté.



## Polohrubovlnové plemená

**Zošľachtená valaška** je uznané novovyšľachtené plemeno mliekovovlnového typu pre horské oblasti Slovenska. Vzniklo krížením hrubovlnových valašiek s plemenami východofrízske, texel, hampshire, cheviot, poľská valaška, lincoln a leicester. Je stredného telesného rámca, odolná, chodivá, prispôsobená salašníckemu spôsobu chovu v horských a podhorských oblastiach. Hmotnosť bahníc býva **45 – 60 kg**, baranov **60 – 65 kg**. Ročná striž potnej vlny bahníc je **3 – 4 kg**, baranov **5 kg**. Sortimentvlny **C/D – D/E**, výťažnosť vlny **65 – 70 %**, plodnosť **115 %**. Ročná produkcia mlieka je **150 kg** ( po odstave jahňaťa **90 kg** ).



## Hrubovlnové plemená

**Valaška** sa dnes vyskytuje len ojedinele na severnom a strednom Slovensku v málo úžitkových chovoch.